



Kinder- und Jugendärztin
Dr. med. Cornelia Langner

Trierer Str. 45 - 52078 Aachen
Telefon: 0241 575150
Fax: 0241 575402

info@kinderaerztin-langner.de
www.kinderaerztin-langner.de

Madenwürmer (Oxyuren)

Madenwürmer sind 5 – 15 mm lang, weiß und kringeln sich mit lebhaften Bewegungen aus frischem Stuhl, sofern man dies bei einer geeigneten Toilettenschüssel überhaupt erkennen kann.

Da sie vor allem nachts zur Eiablage in die Afterhautfalten kriechen, verursachen sie quälendes Afterjucken, was zu dem Verdacht auf Wurmbefall führen kann.

Zum Nachweis von Wurmeiern:

drückt man morgens einen klaren Tesafilmstreifen auf den After, zieht ihn anschließend wieder ab und klebt ihn danach auf eine Glas-Objekt-träger.

Bitte schon am Abend zuvor keine Cremes auf den After!

Dem Arzt gelingt bei Wurmbefall unter dem Mikroskop dabei meistens der Nachweis von Wurmeiern.

Was ist zu tun?

Bekämpft werden Madenwürmer durch eine Gabe von 1 Tablette des verschreibungspflichtigen Präparats Vermox®. Die Würmer werden dadurch schnell abgetötet.

Weitere Maßnahmen um einen erneuten Wurmbefall vorzubeugen:

- Fingernägel kurz schneiden. Peinlicher Reinigung von Händen und Fingernägeln erforderlich, um die Selbstinfektion zu verhindern.
- Bei wiederholtem Auftreten Behandlung sämtlicher Familienmitglieder, auch der Erwachsenen.
- Nachts eng anliegende Hosen. Bett- und Nachtwäsche wechseln und bei 60° waschen
- Handtuchwechsel
- Morgendliches Waschen der After- und Scheidenregion unter fließendem Wasser
- Bettwäsche nicht ausschütteln
- Gründlich Staubsaugen insbesondere im Schlafbereich

ALS VORBEUGENDE MAßNAHME SOLLTE MAN KINDERN BEBRINGEN, DIE HÄNDE VOR DEN MAHLZEITEN GRÜNDLICH ZU WASCHEN.